

Cuántas mujeres se embarazan usando estos metodos anticonceptivos en 1 año?

Que es LARC?

Larga

Acción

Reversible

Contraceptivos


Una manera gratis, segura, facil, y privada de controlar cuando tu tendras tus hijos!

Anticonceptivos reversibles



Implante

Menos de 1 en 100 mujeres!!



Systema intrauterino

Usando Metodos Tradicionales que usan hormonas

8 de 100 mujeres



El Parche



La Pildora



El Anillo

Usando Metodos de barrera



Condomes

15 de 100 mujeres

Porque un Anticonceptivo reversible?

Metodos de larga duracion y reversible como el sistema intrauterino (SIU) o implante son:



- FACIL sin alarmas, calendarios, o visitas frecuentes al doctor o farmacista
- De larga duración para tu conveniencia
- Reversible para cuando quieras embarazarte
- Preferida por los adolescentes y doctores



El Systema intrauterine y implante:

- NO aumentara tu peso.
- NO afectara tu habilidad de embarazarte despues de que sea eliminado
- NO te protejera contra enfermedades de transmision sexual incluyendo el CIDA – Deves usar un condon todas las veces!

Escoje la mejor opción para tí! Previene el embarazo la manera inteligente!

	Systema intrauterino	Implante
		
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> -Seguro para todos los jovenes! -Primero se hace una prueba de ETS (enfermedades de transmisión sexual) 	Seguro para todos los jovenes!
Como trabaja	Pequeñas cantidades de hormonas son liberadas por 5 años	Pequeñas cantidades de hormonas son liberadas por 3 años
Como se usa	<ul style="list-style-type: none"> -Un pequeño dispositivo se mete por el cervix y se sienta en el utero. -No se ve por afuera. -Puede ser eliminado por un doctor cuando sea! 	<ul style="list-style-type: none"> -La piel se adormece y una pequeña barra es puesta debajo de la piel de'l brazo. -A veces una pequeña barra se ve cuando la piel se pincha. -Puede ser eliminado por tu doctor cuando quieras.
Que esperar	<ul style="list-style-type: none"> -Algunos sienten calambres despues de inserción . -Cambios en sangría (la mayor tiene menos frecuente periodos y asta paran de sangreir completamente). 	<ul style="list-style-type: none"> -Algunos sienten dolor en el brazo despues de la inyección. -Cambios en sangría (la mayor tiene menos frecuente periodos y asta paran de sangreir completamente). -Pocos sienten cambios en la piel, humor, dolor de cabeza, nausea, y cenos doloridos.

Todas las mujeres con seguro/ y algunas que no lo tienen, pueden obtener estos dispositivos Gratis en estas ubicaciones:

St. Christopher's Adolescent Clinic (215) 427-3802
 Temple Family Planning Clinic (215) 707-3232
 Drexel Women's Care Center (215) 762-7824
 Einstein Family Planning Clinic (215) 456-7180
 Planned Parenthood (215) 496-9696
 CHOICE Teen Hotline (for more options) (215) 985-3300

Nelson Pavilion 3601 A St., 2nd Floor
 Broad and Tioga, 8th Floor
 1427 Vine Street, 7th Floor
 5501 Old York Road, Paley Building 3
 1211 Chestnut Street, 4th Floor